



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®



POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## PICARDIE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 05 du 23 mai 2003 - 02 pages

# Pomme de Terre

## Phénologie

Le stade varie entre «non levée» (principalement variétés chair ferme) à 15 cm de végétation (variétés féculières).

### En culture

Des symptômes de mildiou sur tas de déchets sont observés sur le site de Bray sur Somme. Il est important de suivre l'évolution de l'état de la végétation sur le tas.

## Mildiou

### Bien traiter

Afin d'éviter la création d'un foyer de mildiou dans la parcelle, il convient tout d'abord d'utiliser un **pulvérisateur bien réglé** (volume, buse, pression, vitesse d'avancement), tant pour améliorer l'efficacité du traitement, que pour limiter l'effet sur l'environnement.

Le traitement doit également atteindre l'ensemble de la parcelle de façon homogène (attention aux courts tours, aux démarrages et aux raccordements de rampe), et l'ensemble de la végétation (rampe stable et à bonne hauteur).

Il convient aussi de traiter dans de bonnes **conditions climatiques** : bonne hygrométrie (minimum 60 %), absence de vent, température modérée (maximum 20 °C).

La présence de repousses de pommes de terre est importante dans les parcelles de betteraves. Observez leur feuillage, elles peuvent être aussi à l'origine des foyers primaires. Dans la mesure du possible, il est conseillé de limiter au maximum leur importance.

### Le coin des modèles

D'après notre modèle Guntz-Divoux, la 3<sup>ème</sup> génération est en cours sur l'ensemble des stations climatiques. On peut observer un gradient de risque de l'ouest vers l'est de la région. Les stations d'Inval, Marcelcave, Saint Just en Chaussée, Villeroi et Villers Bocage annoncent la 4<sup>ème</sup> génération.

### Date de renouvellement des traitements

L'objectif est d'éviter les traitements systématiques à 7 jours lorsqu'ils sont inutiles, et de limiter les intrants en réalisant les interventions «au meilleur moment seulement quand c'est utile».

Situation épidémiologique poste par poste  
(d'après Guntz-Divoux)

Postes climatiques	Génération	Dates prévues de sortie de taches	Potentiel de sporulation
Inval	4 <sup>ème</sup>	24 mai	moyen
Villers Bocage	4 <sup>ème</sup>	26 mai	faible
Amiens	3 <sup>ème</sup>	26 mai	faible
Marcelcave	4 <sup>ème</sup>	26 mai	moyen
Vauvillers	3 <sup>ème</sup>	26 mai	faible
Attily	3 <sup>ème</sup>	26 mai	moyen
Forté	3 <sup>ème</sup>	26 mai	moyen
Froidmont	3 <sup>ème</sup>	27 mai	faible
Ebouleau	3 <sup>ème</sup>	24 mai	moyen
Vic sur Aisne	3 <sup>ème</sup>	26 mai	moyen
Verdilly	3 <sup>ème</sup>	26 mai	faible
Saint Just en Chaussée	4 <sup>ème</sup>	26 mai	moyen
Villeroi	4 <sup>ème</sup>	26 mai	faible
Villers le Sec	3 <sup>ème</sup>	25 mai	faible

**Mildiou :**  
Taches  
sporulantes  
présentes sur  
tas de déchets :  
Détruisez les !

**Intervention  
fongicide généralisée sur va-  
riétés sensi-  
bles,**

**Intervention  
fongicide sur  
variétés inter-  
médiaires si  
mildiou dans  
l'environne-  
ment.**

Ministère  
de l'Agriculture  
Service Régional de la  
Protection des Végétaux

Allée de la Croix Rompue  
518, rue St Fuscien  
BP 69  
80092 AMIENS  
CEDEX 3  
Tél : 03.22.33.55.97  
Fax : 03.22.33.55.56  
E-mail : srpv.draf-  
picardie@agriculture.gouv.fr  
Notre site : www.srpv-  
picardie.com

Imprimé à la station  
d'Avertissements  
Agricoles d'AMIENS  
Directeur gérant :  
Christophe MARTINET  
Publication périodique  
C.P.A.P. n°1823AD  
ISSN n°07576609

Tarif Courrier 57 €  
Tarif Fax 57€  
Tarif E-mail 57 €

Notre modèle Guntz-Divoux nous permet de positionner au mieux le premier traitement (voir bulletin précédent).

Notre modèle MILSOL nous apporte des informations sur le potentiel de sporulation. Nous vous les communiquerons dorénavant dans le tableau de situation épidémiologique poste/poste dans la colonne «potentiel de sporulation».

Ce potentiel (nul, faible, moyen ou fort) vous servira à raisonner le renouvellement de vos traitements fongicides.

**Lorsque le potentiel de sporulation est nul** (absence de tache active), les conditions climatiques favorables ne permettent pas une production significative d'inoculum.

Le renouvellement des traitements peut être décalé même en variétés sensibles lorsque l'environnement de la parcelle est sain.

**Lorsque ce potentiel est fort**, il faut au contraire soigner la protection fongicide, dans tous les cas de figure.

**Lorsqu'il est faible ou moyen**, le raisonnement est modulé en fonction de l'environnement de la parcelle, des conditions météorologiques et de la sensibilité variétale. Pour ce dernier point, le renouvellement est nécessaire à partir d'un potentiel de sporulation faible pour les variétés sensibles, moyen pour les variétés intermédiaires.

## Préconisations

### ➤ **sur variétés résistantes**

Aucune intervention fongicide ne se justifie.

### ➤ **sur variétés intermédiaires**

Plusieurs cas se présentent :

**1- Parcelles situées dans les secteurs avec tas de déchets avec symptômes sporulants.** La 1ère intervention est à réaliser dès que possible, quelle que soit la génération de mildiou atteinte.

**2- Parcelles situées dans les secteurs sans tas de déchets présents dans l'environnement,** attendre l'arrivée de la 4ème génération. Si c'est déjà le cas, l'intervention doit être réalisée en début de semaine prochaine (26-27 mai).

### ➤ **sur variétés sensibles**

Dans la continuité du dernier message, plusieurs cas se présentent:

**1- Parcelles situées dans les secteurs avec tas de déchets avec symptômes sporulants.** La 1ère intervention fongicide a dû être réalisée. Le potentiel de sporulation est faible pour la moitié des postes, moyen pour les autres. Le renouvellement du traitement ne peut donc pas être décalé.

Le délai de renouvellement peut être de 6 ou 7 jours selon la vitesse de croissance. Il sera plus court si le mancozèbe a été lessivé (20 mm).

**2- Parcelles situées dans les secteurs sans tas de déchets présents dans l'environnement.** La 3e génération est atteinte sur l'ensemble des postes. L'intervention doit avoir lieu avant la date prévue de sortie de taches (voir tableau).